另外,本组术后早期癌占 18.03%,高于普通胃 LGIEN 的结果^[5],考虑与所选胃食管连接部位有关。胃食管连接部病变胃镜黏膜活检所提供的信息有限,存在早期癌漏诊,不能完全依据术前 LGIEN 结果做出随访定论,鉴于较高的诊断不足率和早期癌漏诊率,我们建议对于胃食管连接部黏膜活检 LGIEN 应积极进行 ESD 治疗,切除完整病灶,尤其是病灶≥10 mm、凹陷型病灶,既可以避免早期癌漏诊,也可以进行完整黏膜大块活检,提高诊断准确性,同时也能减轻患者心理压力,避免患者长期生活在癌前病变的阴影下,提高生活质量。

参 考 文 献

[1] Dixon MF. Gastrointestinal epithelial neoplasia: Vienna revisited [J]. Gut, 2002,51(1):130-131.
 [2] 朱燕华,吴云林,吴巍,等.胃黏膜低级别上皮内瘤变诊断及治疗探讨[J].中华消化病与影像杂志(电子版),2015,5(4):8-12. DOI: 10.3877/cma.j.issn.2095-2015.2015.04.003.
 [3] 张颖.提高对胃低级别上皮内瘤变中高级别上皮内瘤变诊断

水平的研究进展[J].临床消化病杂志,2017,29(1):51-54. DOI: 10.3870/lexh.j.issn.1005-541X.2017.01.16.
 [4] 中华医学会消化内镜学分会,中国抗癌协会肿瘤内镜专业委员会.中国早期胃癌筛查及内镜诊治共识意见(2014年,长沙)[J].中华消化内镜杂志,2014,31(7):361-377. DOI: 10.3760/cma.j.issn.1007-5232.2014.07.001.
 [5] Choi CW, Kang DH, Kim HW, et al. Endoscopic submucosal dissection as a treatment for gastric adenomatous polyps: predictive factors for early gastric cancer[J]. Scand J Gastroenterol, 2012,47(10):1218-1225. DOI: 10.3109/00365521.2012.666674.
 [6] 肖强,宋育林.胃粘膜低级别上皮内瘤变随访研究[J].中华疾病控制杂志,2014,18(2):147-150.
 [7] Goo JJ, Choi CW, Kang DH, et al. Risk factors associated with diagnostic discrepancy of gastric indefinite neoplasia: Who need en bloc resection? [J]. Surg Endosc, 2015,29(12):3761-3767. DOI: 10.1007/s00464-015-4151-8.

(收稿日期:2018-04-07)
 (本文编辑:顾文景)

· 病例报道 ·

Klippel-Trenaunay 综合征并消化道出血一例

刘会娜 吴广利 王伟 李静 李建成 肖欣 蔡译苇 刘君

患者女,59岁,因“反复便血50余年伴腹痛2d”入院。患者幼年时因先天性左手中指、环指畸形行手术治疗,父母非近亲婚配,无类似疾病家族史。入院体检:轻度贫血貌,左手畸形术后改变,余无异常发现。入院后实验室检查:红细胞 $4.38 \times 10^{12}/L$,血红蛋白114 g/L,红细胞压积36%,大便潜血阳性,凝血分析、癌胚抗原未见明显异常。肠系膜上下动静脉彩超未见明显异常。腹主动脉彩超示腹主动脉内膜增厚。腹部CT平扫示腹盆腔多脏器多发异常改变,考虑血吸虫病可能,并肝硬化样改变,下腹部及盆腔部分肠管扩张,管壁增厚,肝脏、脾脏多发低密度灶,腹盆腔多发结节状、条片状密度增高影。进一步行上腹部CT增强示直肠、乙状结肠弥漫性增厚并管腔狭窄,伴腹、盆腔及肠系膜多发结节并部分钙化;肝脏、脾脏多发良性囊性病变,考虑肝硬化门静脉海绵样变性(?),门脉高压并侧枝循环形成,肠系膜上静脉分支内栓子形成可能;左侧附件区囊性改变,考虑良性;回肠

末端管壁增厚并脂肪瘤形成。结肠镜检查示回盲部、降结肠、乙状结肠、直肠可见多发大小不等的蓝色血管瘤密布于肠黏膜下(图1)。胃镜检查示胃体上部后壁见一约1.7 cm隆起性病变(图2A)。超声内镜考虑间质瘤或血管瘤可能(图2B)。诊断:Klippel-Trenaunay综合征(KTS)并消化道出血;轻度失血性贫血。给予止血等对症支持治疗,因患者个人原因未行小肠镜及血管造影检查,拒绝外科诊治,症状改善后自行出院。近1年患者仍有间断性便血发生,经止血等治疗后便血消失,目前继续随访中。

讨论 KTS是一种少见的先天性血管疾病,多自幼年发病,临床少见,易被误诊,无明显性别、种族差异^[1]。目前病因未明,可能是由于胚胎发育早期中胚层发育异常所致。1900年由Maurice Klippel和Paul-Trenaunay首次报道,典型临床表现为毛细血管畸形(葡萄酒色斑)、静脉曲张、骨及软组织增生三联征,具有三联征中两项或以上特征可确诊。KTS可全身受累,如四肢、肠道、泌尿生殖系统等,部分患者可伴有多趾、巨趾、并趾畸形及淋巴系统异常,多累及下肢,单侧为著,大多发展缓慢^[2]。本例患者自幼年时开始反复出现便血,胃肠镜检查提示消化道多发血管瘤,全腹CT增强示直肠、乙状结肠等肠管管壁明显增厚累及软组,并见门

DOI:10.3760/cma.j.issn.1007-5232.2018.11.010
 作者单位:256600 山东省滨州市,滨州医学院附属医院消化内科
 通信作者:吴广利,Email:guangli-wu@163.com

图 1 Klippel-Trenaunay 综合征患者肠镜下见消化道多发大小不等的蓝色血管瘤 1A:回盲部病变;1B:降结肠病变;1C:乙状结肠病变;1D:直肠病变

图 2 胃体病变 2A:胃镜检查示胃体上部后壁见一约 1.7 cm 隆起性病变;2B:超声内镜下成像

静脉、脾静脉、肠系膜上静脉等血管迂曲扩张,诊断 KTS 成立,先天性手指畸形可能是该综合征的表现之一。

KTS 并发消化道出血比较少见,主要表现为间断便血或隐匿性便血,少数大出血而危及生命,最常见的出血部位是远端结肠和直肠^[3]。该例患者长期便血,内镜检查提示上下消化道多发血管瘤,虽然未行小肠镜检查,但考虑累及全消化道可能性大,实为罕见。本病通过临床表现及影像学检查可以诊断。超声为 KTS 血管畸形的首选检查方法^[4],磁共振对于骨与软组织增生程度评价最有效^[5]。鉴别诊断:(1) Parkes-Weber 综合征(PWS),亦具有 KTS 的 3 个典型症状,常为高流量血管畸形,而 KTS 为单纯低流量静脉系统异常,PWS 的皮肤毛细血管畸形较 KTS 更为弥漫且颜色更红,动静脉瘘为两者最主要的鉴别点;(2) 海绵状血管瘤,发病部位以盲肠和升结肠多见,病理学以瘤体与主干静脉之间引流静脉相通形成异常的血窦为特点,发展与患者成长不成比例,不会出现 KTS 典型的三联征表现;(3) 蓝色橡皮泡痣综

合征^[6],以皮肤与内脏血管畸形为特征的罕见疾病,肢体受累少见,内镜检查是诊断的金标准,内镜下表现为青紫色橡胶球样有弹性的血管瘤。

目前 KTS 无特效治疗方法,临床上主要是对症和减轻症状治疗。加压疗法(医用弹力绷带或穿弹力袜)作为一种保守治疗的主要方式,对治疗静脉曲张和淋巴管性水肿有一定疗效。出血、感染、畸形血管血栓等是手术治疗的绝对适应证,微创介入治疗是目前治疗静脉畸形的常用方法。

参 考 文 献

- [1] Sung HM, Chung HY, Lee SJ, et al. Clinical Experience of the Klippel-Trenaunay Syndrome [J]. Arch Plast Surg, 2015, 42 (5): 552-558. DOI: 10. 5999/aps.2015. 42. 5. 552.
- [2] Banzić I, Branković M, Maksimović Ž, et al. Parkes Weber syndrome-Diagnostic and management paradigms: A systematic review [J]. Phlebology, 2017, 32 (6): 371-383. DOI: 10. 1177/0268355516664212.
- [3] 那金波. 以下肢病变为主的 Klippel-Trenaunay 综合征的诊治新进展[J]. 医学综述, 2012, 18 (23): 4012-4015.
- [4] 徐涛, 张云山, 李馨, 等. 彩色多普勒超声评价 Klippel-Trenaunay 综合征静脉畸形[J]. 中国医学影像技术, 2017, 33 (7): 1119-1120. DOI: 10. 13929/j. 1003-3289. 201610120.
- [5] 麦发泽, 黄飏, 钟小玲, 等. Klippel-Trenaunay 综合征临床表现及影像学特征[J]. 中国医学影像技术, 2016, 32 (3): 425-428.
- [6] 肖欣, 吴广利. 蓝色橡皮泡痣综合征的研究进展[J]. 中华临床医师杂志(电子版), 2016, 10 (2): 275-278. DOI: 10. 3877/ema. j. issn. 1674-0785. 2016. 02. 027.

(收稿日期:2018-03-17)

(本文编辑:顾文景)